

TRATAMIENTOS DE TERAPIA COMBINADA EN GLAUCOMA

Familia	Principio activo	Nombre	Concentr.	Presentación	Conserv.	Laboratorio
Análogos de las prostaglandinas	Latanoprost + Timolol	Xalacom	Latanoprost 0,005 Timolol 0,5	Multidosis 2,5 ml	Si	Pfizer
		Fixaprost	Latanoprost 0,005 Timolol 0,5	30 envases unidosis de 0,2 ml	No	Thea
	Bimatoprost + Timolol	Ganfort	Bimatoprost 0,03 Timolol 0,5	Multidosis 3 ml	Si	Abbvie
				30 envases unidosis de 0,4 ml	No	
		Ecbirio	Bimatoprost 0,03 Timolol 0,5	Multidosis 3 ml	No	SIFI
		Bapiri	Bimatoprost 0,03 Timolol 0,5	Multidosis 9 ml	No	Brill
	Travoprost + Timolol	Duotrav	Travoprost 0,004 Timolol 0,5	Multidosis 2,5 ml	Si	Novartis
	Tafluprost + Timolol	Taptiqom	Tafluprost 0,015 Timolol 0,5	Multidosis 3 ml	No	Santen
				30 envases unidosis de 0,3 ml	No	

Ecbirio

0,3 mg/ml + 5 mg/ml
bimatoprost/timolol
colirio en solución



C.N. 728333.1

Familia	Principio activo	Nombre	Concentr.	Presentación	Conserv.	Laboratorio
IAC*	Brinzolamida + Timolol	Azarga	Brinzolamida 1 Timolol 0,5	Multidosis 5 ml	Si	Novartis
	Dorzolamida + Timolol	Visuopt	Dorzolamida 2 Timolol 0,5	Multidosis 5 ml	Si	VisuFarma
				30 y 60 envases unidosos de 0,166 ml	No	
		Cosduo	Dorzolamida 2 Timolol 0,5	Multidosis 5 ml	No	Santen
		Tidimaz	Dorzolamida 2 Timolol 0,5	Multidosis 10 ml	No	Brill
		Duokopt	Dorzolamida 2 Timolol 0,5	Multidosis 10 ml	No	Thea
		Cosopt	Dorzolamida 2 Timolol 0,5	Multidosis 5 ml	Si	Santen
	Cosopt PF	Dorzolamida 2 Timolol 0,5	Multidosis 10 ml	No	Santen	
α-agonistas	Brimonidina + Brinzolamida	Simbrinza	Brimonidina 0,2 Brinzolamida 1	Multidosis 5 ml	Si	Novartis
	Brimonidina + Timolol	Combigan	Brimonidina 0,2 Timolol 0,5	Multidosis 5 ml	Si	Abbvie
Inhibidores rho quinasa	Netarsudil + Latanoprost	Roclanda	Netarsudil 0.02 Latanoprost 0.005	Multidosis 2,5 ml	Si	Santen

* IAC = Inhibidores de la anhidrasa carbónica

SIN CONSERVANTES



Ecbirio

0,3 mg/ml + 5 mg/ml
bimatoprost/timolol
colirio en solución



SIN CONSERVANTES

BIMATOPROST + TIMOLOL



C.N. 728333.1

Financiado por el SNS

**Bimatoprost 0,03% es el
análogo de prostaglandina con
mayor acción hipotensora¹**

**Bimatoprost produce
un mayor aplanamiento y
alargamiento de la curva de la
PIO³**

**Con punta azul de silicona
para mayor precisión y
disminución de efectos
adversos perioculares**

**La ausencia de conservantes
preserva la salud
de la superficie
ocular a largo plazo²**

**Válido hasta
90 días
tras apertura**

**Ofrece un escalón
adicional en el algoritmo
terapéutico**



**ESCANEA PARA
DESCARGAR**

1. Pillunat L.E. et al. Preservative-free bimatoprost 0.03% in patients with primary open-angle glaucoma or ocular hypertension in clinical practice. Clin Ophthalmol. 2016;10:1759-65.
2. European Glaucoma Society Terminology and Guidelines for Glaucoma, 5th Edition.
3. Konstas A. et al. Diurnal IOP control with bimatoprost versus latanoprost in exfoliative glaucoma: a crossover, observer-masked, three-centre study. Br. J. Ophthalmol. 2007; 91(6): 757-60.

Estos productos sanitarios cumplen con la legislación vigente. Material de uso exclusivo médico. FA03062025